

제이클정(20정) 복용법 (오전 검사)

민병원 대표번호 : 02) 982-3114 검진센터 : 02) 982-3399

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토 등 증상 발생시 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

★ 검사 하루전 식사

오후 2시 흰죽으로 마지막 식사 하세요.
(반찬없이 드시고 식사 이후는 물만 드실수 있습니다.)

1차 복용 (검사전날) 오후 6시

오후 6시~



- ① 물 한컵(300ml)을 마십니다.
- ② **제이클 10알을 1-2알씩** 나누어 물과함께 천천히 복용합니다.

오후 6시30분~



- ③ 알약 복용 후 **생수 1리터** 이상 천천히 마십니다.


2차 복용 (검사당일) 오전 5시

오전 5시~



- ① 물 두컵(600ml)을 마십니다.
- ② **제이클 10알을 1-2알씩** 나누어 물과함께 천천히 복용합니다.

오전 5시30분~



- ③ 알약 복용 후 바로 **엔도콜 2포**를 짜서 모두 드세요.
- ④ 마지막으로 **생수 1리터** 이상 천천히 마십니다.

< 장 청소 후 변 색깔 자가진단 >

***변 색깔을 비교해보세요.**



※정확한 검사를 위해서는 장을 깨끗이 비우는 것이 매우 중요합니다.